



Földi pokol... a drog, avagy Cháron a lelkek révésze...





Földi pokol... a drog, avagy Cháron a lelkek révésze...


*„A lét törékeny, olyannyira, mint a
fűszálakról lágyan csüngő, kristálytisza
harmatcsepp, mely az első reggeli fuvallattal elillan.”
(Dilgo Khyentsé Rinpoché)*

Az AIDS betegség tünettana

A biztonságos szexuális élet védekező mechanizmusai

A fiatalok tájékoztatása az AIDS betegség kialakulásáról, a betegség gyógykezelési lehetőségeiről, a védekezési mechanizmusokról.

Az AIDS napjainkban is gyógyíthatatlan, halálos betegség. Első felfedezése óta 20 millió áldozatot szedett szerte a világon. Járványszerű terjedését csak a fiatalok megelőző felvilágosításával állíthatjuk meg.



Mit kell tudni az AIDS-ről?

A fertőzést okozó virust 1984-ben sikerült izolálni és Humán Immun Deficienciát okozó vírusnak (HIV) nevezték el.



A vírus fenntarthatóságának birtokában rohamosan fejlődésnek indult a diagnosztika.

*A vírusfertőzés utáni 2-4 hét között kimutatható a **mági antigén**. Ez az akut vírusfertőzés szakasza. A fertőzött személy még nem tud a betegségéről, viszont vérében ekkor van a legnagyobb koncentrációban a szabad vírus, így a legfertőzőképesebb. Megjelennek a vírusfertőzésre legjellemzőbb tünetek (láz, fejfájás, rossz közérzet, kiütések, stb.), amelyek spontán elmúlnak. A kimutatható vírusantigén eltűnésével párhuzamosan megjelennek az ellenanyagok, először az IgM, majd az IgG típusúak. A betegség végstádiumában ismét megjelenhetnek a vírusantigének (rossz prognosztikai jel) és a beteg ismét fertőzőképesebb.*

A fertőzés kimutatására alkalmazott szűrőtesztek ellenanyag vizsgálaton alapulnak, ami azt jelenti, hogy a vírusfertőzést követő harmadik héten már kimutatható mennyiségben van IgM típusú ellenanyag.

*Igen lényeges, hogy a **fertőzöttség időben kiderüljön**, mert csak így lehet elérni, hogy az opportunistá fertőzések kezelése célzott és hatékony legyen.*

*A **betegség tünetei**: testi fáradékonyság, gyengeségérzet, rejtélyes fogyás, hosszabb ideig fennmaradó láz, éjszakai izzadás.*

A fertőzés átvitelének lehetséges módjai:

- ***Szexuális úton** ondófolyadékkal, hüvelyváladékkal, orális- és anális közösülés folytán, amennyiben hámsérülés történik. Annak a valószínűsége, hogy a rizikócsoportba tartozó személy milyen valószínűséggel fertőződhet meg,*



- *függ a szexuális érintkezési módtól, a szexuális partnerek számától és a védekezés módjától.*
- **Csókolódzással**, ha van hámsérülés, egyéb esetben nem!
- **Bármilyen nemi betegség esetén:** hámsérülés bekövetkeztekor.
- **Anyáról - gyermekekre történő átvitel során:** a gyermek fertőzödhet intrauterin állapotban (ekkor a születéskor levett vér PCR pozitív), de fertőzödhet szülés közben is (ekkor a születéskor levett vér PCR negatív, a hat héttel később megismételt vizsgálat már pozitív), sőt szoptatással is.
- **Közös tű, fecskendő használatokor:** a kábítószer-élvezők rituális belövése során, amely felfogható miniatürizált transzfúciónak is.
- **Vérátömlesztés, vese, bőr, csontvelő, szaruhártya...stb. átültetés útján.**
- **Balesetből eredő fertőzések:** általában az egészségügyben dolgozó személyzet fertőződik meg. A kötelező óvórendszabályok betartásával az ilyen balesetek többnyire elkerülhetők.

Hogyan nem terjed a betegség?

- *A mindennapi kapcsolatokban: pl. otthon, munkahelyen és közlekedési járműveken.*
- *Barátok általi üdvözléskor, kézfogáskor.*
- *Evőeszközök, poharak, fésű, a kéz- és lábápolási eszközök által, kivéve, ha azok szennyezettek vérrel.*
- *Nem terjed közös WC-használatokor, fürdözéskor.*
- *A betegséget nem terjesztik a háziállatok, rovarok, szúnyogok.*




Földi pokol... a drog, avagy Cháron a lelkek révésze...

A betegek kezelése

A betegek hatékony kezelése és a vakcinák kifejlesztésére tett erőfeszítések igen kecsegtetőek, de sajnos a kezdeti biztató eredmények eddig még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Örömhír! 2005. év elején egy magyar kutatóorvosnő sikeres állatkísérletekkel igazolta egy olyan anyag gyógyító tapasz hatását, amely lehetőséget ad az AIDS beteg emberek számára, hogy kigyógyuljanak a betegségből, amelyre **egy esetben már volt példa!**, illetve, hogy ne legyen halálos kimenetelű a megbetegedés.



Megelőzési tanácsok:

A betegség kivédhető a hűséggel, a monogámiával, a biztonságosabb szexuális érintkezéssel, pl. **óvszer használatával**.

A témakör feldolgozásához **ajánlott szakirodalom:**

A szexualitás egészségkönyve. Kossuth Kiadó, 2003.

„Az AIDS egy vírus, mely nem gyógyítható,
életkortól független halálos kór.
Alattomos vírus, láthatatlan ellenség,
Leépülést okozó HIV-pozitív betegség.
S, ha elkapod, akkor jaj neked,
mert kiközösítés lesz a veszted!”

(A D.A.D.A. találkozó Nyírpazony, 2004.)

„ÁMK” csapatának verse)